




Увага!!!

Небезпечна рослина!!!

Борщівник Сосновського — багаторічна рослин родини Аріасеae, поширена на Кавказі й у Росії.

Зростає до 3—5 метрів висоти, товщина стебла — до 10 сантиметрів. Основними місцями його поширення є потічки, береги річок, узбіччя доріг, деградовані пасовища і покинуті поля. Насіння борщівника Сосновського дозріває навіть тоді, коли стовбур рослини зрізано.

Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки, що під дією ультрафіолетового (зокрема сонячного) випромінювання надають йому токсичних властивостей. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків 1-3 ступенів. Опіки, особливо у перші кілька днів, схожі на термічні. Для них характерна гіперемія (почервоніння), водянисті пухирі. Опіки з'являються на вражених ділянках тіла не одразу після контакту, а через 1—2 дні, розвиваючись поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гояться, загострюються прояви інших шкірних захворювань.

**Не торкайтесь до оманливо м'якого листа борщівника Сосновського оголеними руками!
Не дозволяйте дітям зривати листя борщівника чи бавитись ним улітку**

Попереджати про небезпечну рослину чужих і власних дітей

Не використовуйте листя борщівника як серветки ніколи не витирайте ним руки чи ноги

Працюйте з рослиною тільки в щільному одязі та гумових рукавичках.